

Encuesta sobre profilaxis tromboembólica en cirugía podológica

1. ¿Realiza profilaxis tromboembólica en cirugía ungueal?

NO, nunca

SI, cuando el paciente sea ASA II o ASA III

SI, cuando el paciente tenga dificultad de movilidad

SI, siempre por sistema

Dependerá del resultado de la valoración de riesgo tromboembólico

2. ¿Realiza profilaxis tromboembólica en cirugía de partes blandas?

NO, nunca

SI, cuando el paciente sea ASA II o ASA III

SI, cuando el paciente tenga dificultad de movilidad

SI, siempre por sistema

Dependerá del resultado de la valoración de riesgo tromboembólico

3. ¿Realiza profilaxis tromboembólica en cirugía osteoarticular? En caso de que la respuesta sea afirmativa, indique qué criterios sigue y cuáles son las pautas de tratamiento.

NO, nunca

SI, cuando el paciente sea ASA II o ASA III

SI, cuando el paciente tenga dificultad de movilidad

SI, siempre por sistema

Dependerá del resultado de la valoración de riesgo tromboembólico

4. En caso de empleo de HBPM, ¿qué tiempo medio recomienda?

7 días

15 días

Más de 15 días

Hasta que el paciente recupere su movilidad normal